

Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling

Listen har virkning fra april 2024

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

A. Behov for tæt styring af medicineringen

En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel viderebehandling i primærsektoren.

B. Udlevering i henhold til særlige beslutninger

Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres vederlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:

- 1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancerpatienter.
- 2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmssyndrom.
- 3) Samtlige udgifter til hjemmedialyse.

C. Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt. Ligeledes gælder det patienter med betingede domme med vilkår om ambulans psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulans psykiatrisk behandling. De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindslidelser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri medicin kan udleveres svarende til dommens længde. Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:

- 1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/ Behandlingspsykiatrien,
- 2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/ behandlingspsykiatrien eller
- 3) Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

D. Udlevering til kortvarig behandling af akutte potentielt livstruende sygdomme

Patienter med behov for kortvarig antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (efter individuel vurdering) skal efter dette kriterium fremover have mulighed for at modtage antitromboselægemidler i op til 35 dage vederlagsfrit. Dette gælder ligeledes patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling (såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser) i op til 6 uger efter fødsel.

E. Udlevering til patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram

Det er med Kræftplan III aftalt, at alle borgere i alderen 50 – 74 år skal tilbydes screening for tyk- og endetarmskræft begyndende fra 2014. De omhandlede patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet kan få udleveret lægemidlet Moviprep.

F. Medicin til brug før/i forbindelse med koloskopi som udføres på et hospital.

Sygehusbehandling er jf. Sygehusloven gratis for patienten. Det betyder, at patienter, der skal have gennemført en undersøgelse på hospitalet, ikke selv skal betale for lægemidler til brug i forbindelse med undersøgelsen.

G. Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient

Lægemidler der ikke er standardpræparater og som det vil være unødigt besværligt for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk kun på sygehusapoteker.

Udlevering udover listen

Udover listen er der mulighed for at udlevere antibiotika til færdiggørelse af behandling mod hospitalserhvervede infektioner, f.eks. urinvejsinfektion og pneumoni. Det er desuden muligt efter lægeligt skøn at udlevere medicin til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages, indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge. Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Lægemiddelstyrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Lægemiddelstyrelsens webside www.medicinpriser.dk/default.

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologiske lidelser, (herunder knoglemarvsplanterede)	A01AB	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen	Følggevirkning
	A03FA	Propulsiva	Følggevirkning
	A04	Midler mod kvalme	Følggevirkning
	A07A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følggevirkning
	A07D	Peristaltikhæmmende midler (Antipropulsiva)	Følggevirkning
	B01AC	Blodplade-aggregationshæmmere excl. hepariner	Følggevirkning
	B01AB	Heparin-gruppen	Behandling, følggevirkning
	B01AF	Direkte faktor Xa hæmmere	Behandling
	B02AA	Aminosyrer (antifibrinolytika)	Følggevirkning
	B03XA	Andre midler mod anæmi	Følggevirkning
	G03HA	Antiandrogener, usammensatte	Behandling
	H01CA03	Histrelin	Behandling
	H01CB	Antivæksthormoner	Behandling
	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Følggevirkning
	H05BX01	Cinacalcet	Behandling
	J02A	Antimykotika til systemisk brug	Følggevirkning
	J05A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling
	L01	Cytostatika	Behandling
	L02	Hormonterapi	Behandling
	L03A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følggevirkning
L04A	Immunsuppressiva	Behandling	
M05B	Midler mod knoglesygdomme	Behandling	
V03AF	Afgiftningsmidler ved cytotostatikabehandling	Behandling, følggevirkning	
Transplanterede patienter (organer og knoglemarv)	A03FA	Propulsiva	Følggevirkning
	A05AA02	Ursodeoxycholsyre	Følggevirkning
	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling

	J01EE01 J02 J05A L04A V03A	Sulfamethoxazol og trimethoprim Svampemidler til systemisk brug Antivirale midler til systemisk brug Immunosuppressiva Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling Behandling Følggevirkning Behandling, følggevirkning Behandling, følggevirkning
Tuberkulosepatienter	J02 J04A J01MA01 J01MA14	Svampemidler til systemisk brug Midler mod mycobakterier Ofloxacin Moxifloxacin	Behandling Behandling Behandling Behandling
Forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med leversygdom	A07AA11	Rifaximin	Behandling
Hæmofilpatienter	B02AA02 B02BD H01BA02	Tranexamsyre Blodkoagulationsfaktorer Desmopressin injektionsvæske	Behandling Behandling Behandling
Nyrepatienter i dialyse samt patienter med "svær nedsat nyrefunktion" svarende til CKD ("chronic kidney disease") stadie 4 og 5, hvilket vil indbefatte eGFR under 30 ml/min	A02A A11CC A12A B01 B03XA B05CB01 B05D B05Z H05BX01 H05BX02 V03AE	Antacida Vitamin D og analoger Calcium Midler mod blodpropper Andre midler mod anæmi Skyllevæsker Peritonealdialysevæsker Hæmodialysekoncentrater Cinacalcet Paricalcitol Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med behov for parenteral ernæring	B05BA B05XA14 B05XA31 B05XC	Opløsninger til ernæring, parenteral Natriumglycerol-phosphat Elektrolytter i komb. med andre stoffer Vitaminer	Behandling Behandling Behandling Behandling

Patienter med immundefekt	J06BA	Immunoglobuliner, normal human	Behandling
Patienter inficeret med Clostridium defficile	A07AA09 A07AA12	Vancomycin Fidaxomicin	Behandling Behandling
Patienter med hypofysesygdom samt patienter med meget lav højde uden væksthormonmangel. Dette inkluderer fx. Turnerpatienter, patienter med skeletdysplasi, nyreinsufficente patienter, patienter med Prader Willi samt Small for Gestational Age (SGA)	G02CB03 G02CB04 G03B G03C G03D G03F G03G H01A H01BA H01CB H02 H03AA L02AE N04BC01	Cabergolin Quinagolid Androgener Østrogener Progesterogener Gestagener og østrogener i kombination Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende midler Hypofyseforlapshormoner Vasopressin og analoger Antivæksthormon Kortikosteroider til systemisk brug Thyreoideahormoner Gonadotropinfrigørende hormon analoger Bromokriptin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter, som ikke når behandlingsmål for LDL-reduktion med maksimalt tolereret lipidsænkende behandling (skal som minimum skal have forsøgt højdosis statin i kombination med ezetimibe) og som opfylder kriterierne for igangsætning af behandling med PSK9-hæmmer ift vejledningen fra RADS/Medicinrådet.	C10AX13 C10AX14 C10AX16	evolocumab alirocumab Inclisiran	Behandling Behandling Behandling
Patienter med cystinose	A16AA04	Mercaptamin	Behandling
Patienter med kronisk primær binyrebarkinsufficiens	H02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling
Patienter med HIV/AIDS	A01AB A07A J01EC02	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen Antiinfektionsmidler til tarmen Sulfadiazin	Følggevirkning Følggevirkning Behandling af parasitære sygdomme

	J01EE01 J01FF01 J02A J04BA02 J05A L03A P01BD01 V03A	Sulfametoxazole med trimethoprim Clindamycin Svampemidler til systemisk brug Dapsone Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler Pyrimethamin Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling af parasitære sygdomme Behandling af parasitære sygdomme Følggevirkning Følggevirkning, ikke registreret. Behandling Behandling, følggevirkning Behandling af parasitære sygdomme Behandling, følggevirkning
Patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram	A06AD	Moviprep	Tarmtømning før undersøgelse
Patienter, der skal koloskoperes på hospital	A06AB A06AD A06AG	Kontaktlaksantia Osmotisk virkende laksantia Laksantia med lokal virkning i rectum	Tarmtømning før undersøgelse
Sklerosepatienter	N07XX07	Fampridin	Behandling af gangbesvær
Patienter med aktiv bindevævssygdom, inflammatorisk eller autoimmun sygdom, som p.g.a. sygdommens karakter eller udvikling ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af alment praktiserende læger	D11AH08 L01AA01 L04AX03 L04A	Abrocitinib Cyclophosphamid Methotrexate Immunsuppressiva	Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med kronisk viral hepatitis	J05A L03A	Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler	Behandling Behandling
Patienter med multiresistente stafylokokker	A07AA09 D06AX09 D10AF01 J01XC01 J01XX08 J01AA02 J04AB02	Vancomycin Mupirocin Clindamycin Fusidinsyre Linezolid Doxycyclin Rifampicin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling

<p>Patienter i antitrombotisk behandling i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (op til 35 dage)</p>	<p>B01AB04 B01AB05 B01AB10 B01AX05 B01AE07 B01AF01 B01AF02</p>	<p>Dalteparin Enoxaparin Tinzaparin Fondaparinux Dabigatranetexilat Rivaroxaban Apixaban</p>	<p>Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling</p>
<p>Patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling. Dette gælder såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende tromboser (op til 6 uger efter fødsel)</p>	<p>B01AB04 B01AB05 B01AB10</p>	<p>Dalteparin Enoxaparin Tinzaparin</p>	<p>Behandling Behandling Behandling</p>
<p>Patienter med eosinofil øsofagitis, som har klinisk og histologisk behandlingssvigt</p>	<p>A07EA06</p>	<p>Budesonid smeltetabletter</p>	<p>Behandling</p>
<p>Antipsykotika til patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb</p>	<p>N05AB03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13 N05AX15 N05AX16</p>	<p>Perphenazin Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon Cariprazin Brexiprazol</p>	<p>Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling</p>

Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til behandling, patienter med betingede domme med vilkår om ambulat psykiatrisk behandling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulat psykiatrisk behandling	N05AB03 N05AD01 N05AD03 N05AE03 N05AE04 N05AE05 N05AF01 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13 N05AX15 N05AX16	Perphenazin Haloperidol Melperon Sertindol Ziprasidon Lurasidon Flupentixol Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon Cariprazin Brexiprazol	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Antikolinergika til kortvarig behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), hvor man vælger at se an før dosisreduktion eller skift af præparat. Orphenadrin bør foretrækkes, ved leveringsproblemer kan biperiden anvendes.	N04AA02 N04AB02	Biperiden Orphenadrin	Følgevirkning Følgevirkning
Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og tachycardi, som følge af antipsykotisk behandling	C07AA05	Propranolol	Følgevirkning
Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bipolar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), som har dom til behandling, betingede domme med vilkår om ambulat psykiatrisk behandling eller patienter der er	N05AN01 N03AF01 N03AF02 N03AG01	Lithium Carbamazepin Oxcarbazepin Valproinsyre	Behandling Behandling Behandling Behandling

prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	N03AX09	Lamotrigin	Behandling
ADHD patienter med dom til behandling, eller med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling, eller er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling	C02AC02 N06BA02 N06BA04 N06BA09 N06BA12	Guanfacin Dexamfetamin Methylphenidat Atomoxitin Lisdexamfetamin	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med Lennox-Gastauts syndrom, Dravets syndrom eller anden svær epilepsi	N03AX24	Cannabidiol	Behandling